

การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในชุมชน เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันหรือสงสัย COVID-19

เช่น โรงเรียน สถานที่รับเลี้ยงเด็ก สถานที่ประชุม หรือสำนักงาน

บริเวณที่ผู้ป่วยใช้งาน



ปิดบริเวณที่ผู้ป่วยใช้งานชั่วคราว เปิดหน้าต่าง และประตูให้อากาศถ่ายเทสะดวก (ประมาณ 24 ชั่วโมง ถ้าทำได้) ก่อนเริ่มทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ

การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อควรทำโดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนให้เข้าใจวิธีทำความสะอาด วิธีการใช้น้ำยาต่างๆ และการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย



ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อในทุกพื้นที่ที่ผู้ป่วยใช้งาน เช่น สำนักงาน พื้นที่ส่วนกลาง ห้องอาหาร หรือห้องน้ำ โดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย

ทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆตามปกติก่อน เนื่องจากสิ่งสกปรกบนพื้นผิวจะทำให้ประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อลดลง หลังจากนั้นใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดถูพื้นผิวตามคำแนะนำบนฉลาก



ผ้าหากสามารถซักทำความสะอาดได้ ให้ซักด้วยน้ำร้อนและผงซักฟอก

บริเวณที่ผู้ป่วยไม่ได้ใช้งาน

ทำความสะอาดตามปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ

ไม่มีความจำเป็นต้องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นบริเวณกว้าง เช่น อาคาร หรือ ทางเดิน ที่ไม่มีเลือดหรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยปนเปื้อน



เนื่องจากเชื้อโรคอาจไม่สัมผัสกับน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือระยะเวลาสัมผัสสั้นเกินไป ทำให้ไม่ได้ผล สิ้นเปลือง และอาจเกิดอันตราย



ยาฆ่าเชื้อที่ใช้ได้

น้ำยาฟอกขาว (sodium hypochlorite)
เข้มข้น 0.05%
ผสมน้ำยา 1 ส่วน ในน้ำ 99 ส่วน
ใช้สำหรับพื้นผิวทั่วไป
เข้มข้น 0.5%
ผสมน้ำยา 1 ส่วน ในน้ำ 9 ส่วน
ใช้สำหรับพื้นผิวที่มีน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ สารคัดหลั่ง เช่น ห้องสุขา โถส้วม ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที
ข้อควรระวัง
มีกลิ่นฉุน กัดกร่อนโลหะได้ หากสัมผัสถูกผิวหนังจะทำให้เกิดการปวดแสบร้อนที่บริเวณสัมผัส

แอลกอฮอล์
เข้มข้น 70%
ใช้สำหรับพื้นผิวโลหะ
ข้อควรระวัง
ระคายเคืองผิวหนัง ทำให้อโลหะเป็นสนิม

ผงซักฟอก
ผสมกับน้ำร้อน 70 °C
ใช้สำหรับสิ่งแวดล้อม หรือวัสดุที่เป็นผ้า เช่น ผ้า màn ผ้าปูที่นอน
ข้อควรระวัง
ระคายเคืองผิวหนัง

เดทтол (4.8% Chloroxylonol)
เข้มข้น 2.5%
ผสมน้ำยา 1 ส่วน น้ำ 39 ส่วน
ใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นผิว ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 5 นาที
เข้มข้น 5 %
ผสมน้ำยา 1 ส่วน กับ 70% แอลกอฮอล์ 19 ส่วน
ใช้สำหรับเครื่องมือ เครื่องใช้ ในครัวเรือน ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 5 นาที
ข้อควรระวัง
ระคายเคืองผิวหนัง เกิดอาการแพ้

